



# 08 επαναληπτικά θέματα

## Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ

### ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

#### ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>

1.  $\gamma$
2.  $\delta$
3.  $\beta$
4.  $\gamma$
5. (α)  $\Sigma$   
(β)  $\Lambda$   
(γ)  $\Sigma$   
(δ)  $\Sigma$   
(ε)  $\Lambda$

#### ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>

$$1. \frac{K}{U} = \frac{E - U}{U} = \frac{\frac{1}{2} D A^2 - \frac{1}{2} D \frac{A^2}{4}}{\frac{1}{2} D \frac{A^2}{4}} = 3 \quad \text{Σωστό το } \gamma.$$

$$2. E = 25\% E_0 \Rightarrow \frac{1}{2} D A^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} D A_0^2 \Rightarrow A = \frac{A_0}{2} \quad \text{Σωστό το } \alpha.$$

3. α. Σωστή. ( $T_0 = T$  γιατί  $f = \text{σταθερή}$ )
- β. Λάθος

$$8\pi 10^6 x = 2\pi \frac{x}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{10^{-6}}{4} m$$

$$4\pi 10^6 x = 2\pi \frac{x}{\lambda_0} \Rightarrow \lambda_0 = \frac{10^{-6}}{2} m$$

$$\text{Άρα } n = \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{2}{10^{-6}} = 2$$

$$\eta \mu \theta_{kp} = \frac{n_{oepa}}{n} = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta_{kp} = 30^\circ$$

άρα παθαίνει ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

4.  $L = I\omega \Rightarrow L = Ia_{\gamma\omega\nu}t \Rightarrow \frac{L}{t} = Ia_{\gamma\omega\nu}$

$$\left. \begin{array}{l} \varepsilon\phi\theta_1 = \frac{2L}{t} \\ \varepsilon\phi\theta_2 = \frac{L}{t} \end{array} \right\} \Rightarrow \varepsilon\phi\theta_1 = 2\varepsilon\phi\theta_2 \Rightarrow I\alpha_{\gamma\omega\nu 1} = 2I\alpha_{\gamma\omega\nu 2} \Rightarrow \alpha_{\gamma\omega\nu 1} = 2\alpha_{\gamma\omega\nu 2}. \text{ Σωστό το } \beta.$$

### ΘΕΜΑ 3<sup>o</sup>

$$A = 0,1m$$

$$2T = 0,4s \Rightarrow T = 0,2s$$

$$f = 5Hz$$

$$\omega = 10\pi \frac{rad}{s}$$

$$a) v = \frac{x}{t} = \frac{4}{0,4} = 10 \frac{m}{s}$$


$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{10}{5} = 2m$$

b)  $\phi = \omega t \Rightarrow 10\pi t = 3,75\pi \Rightarrow t = 0,375s$

Το κύμα έχει διαδοθεί σε απόσταση:  $x = vt = 3,75m$

$$\begin{aligned} v &= v_{max} \sigma v \nu 2\pi \left( \frac{t}{\tau} - \frac{x}{\lambda} \right) = 0,1 \cdot 10\pi \sigma v \nu 2\pi \left( \frac{0,375}{0,2} - \frac{3}{2} \right) = \\ &= \pi \sigma v \nu 2\pi (1,875 - 1,5) = \\ &= \pi \sigma v \nu \frac{3\pi}{4} = \pi \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -\frac{\pi \sqrt{2}}{2} m/s \end{aligned}$$

$$\gamma) \frac{t}{T} = \frac{0,25}{0,2} = 1,25 \Rightarrow t = 1,25T$$



$K_{max}$  έχοντας τα σημεία  $\Gamma, \Delta, Z$

$$x_\Gamma = \frac{\lambda}{4} = 0,5m$$


$$x_\Delta = \frac{3\lambda}{4} = 1,5m$$

$$x_Z = \frac{5\lambda}{4} = 2,5m$$

**δ)**  $A = A_1 - A_2 \Rightarrow 0,1 = A_1 - 0,1 \Rightarrow A_1 = 0,2m$   
 $y_1 = 0,2\eta\mu 10\pi t \text{ (SI)}$

## ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>


**α)**

$$\left. \begin{aligned} I &= I_{\delta\alpha\kappa\tau} + 2I_{\rho\alpha\beta\delta} \\ I_{\delta\alpha\kappa\tau} &= MR^2 = 6kgm^2 \\ I_{\rho\alpha\beta\delta} &= \frac{1}{12}ml^2 = \frac{1}{12}3 \cdot 2^2 = 1kgm^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow I = 8kgm^2$$


**β)**  $M_{o\lambda} = M + 2m = 12Kg$


$$\Sigma Fy = 0 \Rightarrow N = M_{o\lambda}g\sigma\nu\nu\phi$$

$$\Sigma Fx = M_{o\lambda}a_{cm} \Rightarrow F - T_{\sigma\tau} - M_{o\lambda}g\eta\mu\phi = M_{o\lambda}a_{cm} \Rightarrow T_{\sigma\tau} = F - M_{o\lambda}g\eta\mu\phi - M_{o\lambda}a_{cm} \quad (2)$$


$$\Sigma \tau_{cm} = I \cdot a_{\gamma\omega\nu} \Rightarrow T_{\sigma\tau} \cdot R \leq I \frac{a_{cm}}{R} \Rightarrow T_{\sigma\tau} = \frac{I}{R^2} a_{cm} \quad (3)$$


$$(2)(3): F - M_{o\lambda}g\eta\mu\phi - M_{o\lambda}a_{cm} = \frac{I}{R^2} a_{cm} \Rightarrow a_{cm} = 2 \frac{m}{s^2}$$


(3)  $T_{\sigma\tau} = 16N$





**γ)**  $\frac{dK_{\sigma\tau\rho\phi}}{dt} = \sum \tau \cdot \omega = T_{\sigma\tau}R\omega \quad (4)$



$$N = \frac{\theta}{2\pi} \Rightarrow \theta = N \cdot 2\pi = 25rad$$


$$\theta = \frac{1}{2}a_{\gamma\omega\nu}t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2\theta}{a_{\gamma\omega\nu}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 25}{2}} = 5s$$


$$\omega = a_{\gamma\omega\nu}t = 10 \frac{rad}{s}$$


$$(4) \Rightarrow \frac{dK_{\sigma\tau\rho\phi}}{dt} = 160 \frac{J}{s}$$


**δ)** Μετά το B δεν υπάρχει  $T_{\sigma\tau}$  οπότε η στροφική κίνηση είναι ομαλή.

AΔME:  $U_B + K_B = U_\Gamma + K_\Gamma \quad (5)$



$$K_B = \frac{1}{2}I\omega_B^2 + \frac{1}{2}M_{o\lambda}v_B^2$$

$$K_\Gamma = \frac{1}{2}I\omega_B^2 + \frac{1}{2}M_{o\lambda}v_\Gamma^2$$

(5)  $\Rightarrow v_\Gamma = 12m/s$